مُنہ کُھر

جانوروں میں مُنہ کُھر کی بیماری سے بچاؤ کے حوالے سے

مویشی پال حضرات کے لیے

اہم نکات

- مُنہ کُھر کا وائرس جانوروں کے مُنہ اور کُھروں کے درمیان کھال پر حملہ کرتا ہے۔
- بھینسوں اور گائے میں زبان، تالو، مسوڑھوں، حیوانہ اور کُھروں کے درمیان چھالے بن جاتے ہیں۔
- متاثرہ جانوروں کو تیز بخار ہو جاتا ہے۔ خوراک کھانا بند کر دیتے ہیں اور دودھ کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔
- بھیڑوں اور بکریوں میں چھالوں کی جگہ منہ میں سرخ دھبے نظر آتے ہیں اور منہ سے رال ٹپکتی ہے۔

مُنہ کُھر سے محفوظ رکھنے کے لیے

- سال میں دو مرتبہ یعنی موسم بہار (مارچ، اپریل) اور موسم خزاں (ستمبر، اکتوبر) میں مُنہ کُھر کے حفاظتی ٹیکے لگوانے چاہئیں۔
- متاثرہ جانور کو صحت مند جانور سے الگ رکھیں اور باڑے کی صفائی کا خیال رکھیں۔
- نئے خرید کردہ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوانے اور مکمل اطمینان کے بعد دوسرے جانوروں میں شامل کریں۔
- بیماری کی صورت میں فوراً قریبی ویٹرنری ہسپتال سے رابطہ کریں۔

مزید معلومات و رہنمائی کے لئے ہیلپ لائن پر مفت کال کریں 0800-78686

لائیوسٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ، حکومت پنجاب

ڈائریکٹوریٹ آف کمیونیکیشن اینڈ ایکسٹینشن

www.livestock.punjab.gov.pk

@PunjabLivestock @Livestockdpunjab @livestockpunjab